La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes.

Representa entre 20 y 40% de las consultas al pediatra. [1]

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Valorar conocimientos, actitudes y creencias de los padres frente a la fiebre de sus hijos. [1]

RESULTADOS

201 encuestas realizadas

59% define fiebre entre 38-38,5°

56,7% respondieron que la fiebre es mala para la salud

La fiebre grave es considerada en 39.2°

TRATAMIENTO DE FIEBRE [1]

97% antitérmicos

93% utiliza medidas físicas

14,5% los alterna alterna métodos

TEMOR A CONSECUENCIAS [1]

86,5% despiertan a sus hijos durante la noche para administrar antitérmico

82% convulsiones

43,9 % realizan colecho

41% deshidratación

18% daño cerebral

12% muerte

CONCLUSIONES

- El nivel de instrucción materna puede influenciar en el temor por la fiebre. [1]
- Conocer a la población permite generar herramientas educativas efectivas hacia los padres. [1]

Eficacia antipirética de AINEs en niños

Autor, año y país	Tipo de estudio	Pacientes	Efecto evaluado	Resultados
Wong, 2001, Brasil	ECAP multinacional	628	Efectividad antipirética de Acetaminofén, Ibuprofeno y Dipirona en niños de 6 meses a 6 años.	Las tasas de normalización de la temperatura por Ibuprofeno y Dipirona fueron significativamente mayores que por Acetaminofén (p=0.004). Después de 4-6 hr la reducción de la temperatura con Dipirona fue más marcada.
Prado, 2006, Perú	ECAP	75	Eficacia y tolerabilidad de una dosis única de Ibuprofeno oral, Dipirona oral o Dipirona intramuscular en niños de 6 meses a 6 años.	la eficacia antipirética y la tolerabilidad fue similar para el Ibuprofeno oral, Dipirona oral y Dipirona intramuscular.



La eficacia antipirética de dipirona fue de 82%, de ibuprofeno 78% y paracetamol 68%. La dipirona tiene efecto antipirético mayor que el paracetamol (p = 0.004). [2]

ECAP: Ensayo clínico aleatorizado prospectivo

1. Castellano V, Talamona N, *et al.* Conocimientos y manejo de la fiebre en padres de niños menores de 5 años en un hospital pediátrico. Arch Argent Pediatr 2020;118(2):89-94

2. Prado J, et al. Sao Paulo Med J 2006;124:135-40. Wong A, et al. Clin. Pediatr. (Phil.), 40, 6 (2001).

Sanofi Aventis Paraguay S.A. Avda. Costanera y Calle 3 - Parque Industrial Barrial - Casilla de correo 777, Asunción, Paraguay - Tel: (595-21) 288 1000 - Fax: (595-21) 288 1111 - www.sanofi.com.py - SAPY.MEM.20.05.0090 05/20